La importancia de la bioinformática en el avance de la biomedicina

Fuencisla Matesanz

Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra, CSIC

El genoma

El genoma es la información genética que posee un organismo o una especie en particular. El soporte en el que se encuentra esta información es el ADN o ARN.

Historia del ADN

1869 Friedrich Miescher, médico suizo, descubrió que el ADN era el componente químico principal del núcleo de las células y lo denominó nucleína.

En 1919 P.A. Theodore Levene descubrió que las unidades constitutivas del ADN son los nucleótidos y que estos están formados por desoxiribosa, una de las 4 bases nitrogenadas (adenina, timina, citosina y guanina) y un grupo fosfato.

Levene consideró que el ADN es incapaz de contener información genética dada la poca complejidad de sus elementos y consideró las proteínas con estructura mucho más compleja y variada como las moléculas clave de la herencia.

Nucleótidos

Purines

Pyrimidines

Aminoácidos

Principio de transformación

1928 el microbiólogo Fred Griffith descubre que un elemento de neumococos podía transmitir características de una cepa virulenta a otra no virulenta y lo denominó "principio de transformación"

ADN es la molécula de la herencia

En 1944 Avery, Mcarthy y McLeod, continuaron el estudio con neumococos y determinaron, mediante la eliminación selectiva de todas las sustancias contenidas en la mezcla, que el principio transformante era necesariamente el ADN.

ADN es la molécula de la herencia

EXPERIMENTO DE AVERY

MÉTODO:

1. Homogeneizar y filtrar

2. Tratamiento del filtrado con enzimas que destruyen el RNA, las proteínas y el DNA

3. El filtrado se añade a un cultivo de cepas R (no virulentas)

RESULTADO:

Los cultivos tratados con **RNAasa** o **proteasa** contienen **cepas S** transformadas...

...sin embargo en el cultivo tratado con **DNAasa** sólo aparecen **cepas R**

CONCLUSIÓN:

Dado que la **DNAasa** destruye el principio transformante, el principio transformante es **ADN**,

En 1953 James Watson y Francis Crick propusieron la estructura del ADN

James Watson y Francis Crick

Rosalind Franklin

RNA Tie Club

George Gamow crea en 1954 “RNA TIE Club” con el objeto de resolver el enigma de la estructura del ARN y para comprender cómo se construye las proteínas.

Postuló que un código de codones de tres bases debía ser el empleado por las células para codificar la secuencia aminoacídica, ya que tres es el número entero mínimo que con cuatro bases nitrogenadas distintas permiten más de 20 combinaciones (64 para ser exactos)

El primer codón en descifrarse UUU

En 1961 Marshall W. Nirenberg, en una conferencia en Moscú, da a conocer el primer codón UUU que codifica la fenilalanina. Johann H. Matthaei y él crean un sistema de poly UUUUU que al traducirse da como resultado poly Phe-Phe.

El descubrimiento y aislamiento de la enzima polinucleótido fosforilasa por parte del Investigador español Severo Ochoa fue determinante para poder descifrar el código genético

El sistema de secuencias repetidas permite descifrar el código genético

Poli-AAG

El código genético

Transferencia de la información del DNA a la proteína

Sanger Method: Dideoxy Chain Termination

dideoxynucleotide (ddNTP)

deoxynucleotide (dNTP)

ddGTP ddATP ddCTP ddTTP

Add ddGTP, ddATP, ddCTP, ddTTP, one to each of four tubes containing target DNA. Load each onto a separate lane on a gel.

G A C T

300-500 bases

A T G C

[Video 1](#)

[Video2](#)

Secuenciación de ADN

En 1977 Fred Sanger, Walter Gilbert, y Allan Maxam, secuencian ADN por primera vez trabajando independientemente. El laboratorio de Sanger completa la secuencia del genoma del bacteriófago Φ -X174

5386 nucleotidos

En 1989 Francis Collins y Lap-Chee Tsui secuencian un gen humano por primera vez. El gen codifica la proteína CFTR, cuyo defecto causa fibrosis quística

Tamaño de los genomas

Historia del proyecto Genoma Humano

[Video](#)

Presupuesto 3.000.000.000\$/ Costó 2.700.000.000 \$

Secuenciación del genoma humano

Ensamblaje del genoma

De novo genome assembly

Bases de datos y sistemas de análisis

Evolución del costo de secuenciación de un genoma

Base de NGS

Variaciones de la secuencia del genoma humano

Los genomas de dos personas son 99,9 % idénticos

Las variaciones en la secuencia de nucleótidos originan cambios fenotípicos que determinan:

- Variaciones fenotípicas normales.

Ilustración de Microsoft

- El riesgo de padecer enfermedades

- La respuesta a factores ambientales como fármacos

VARIANTES ENTRE GENOMAS (POLIMORFISMOS)

- ENTRE DOS INDIVIDUOS: 0,1%
- 3.000.000.000 pares de base genoma haploide
- 1bp : 1.000bp = 3 MILLONES
- EN LA ESPECIE HUMANA > 10 MILLONES
- TIPOS:
 - **SNP** (Single Nucleotide Polymorphism)
 - **CNV** (Copy Number Variation)
 - inserciones, duplicaciones, deleciones
 - inversiones, translocaciones

Estas diferencias entre genomas pueden ser de una única base SNP (Single-nucleotide polymorphism) o fragmentos grandes del genoma CNV (Copy number variation)

SNP

Individuo 1 ···ATTTAGATCGGATAGA···

Individuo 2 ···ATTTAGATCTCGATAGA···

CNV

Individuo 1

Individuo 2

Individuo 3

Individuo 4

Determinación de variabilidad humana

Localización de diferencias en las secuencias

Avances en conocimientos en Biología

Regiones del genoma que se asocian con enfermedades

Published Genome-Wide Associations through 12/2013
Published GWA at $p \leq 5 \times 10^{-8}$ for 17 trait categories

La mayor parte del genoma no tiene genes

The fraction of non-protein-coding DNA and megabases of protein coding sequence (CDS) per haploid genome in different species.

Mattick J S J Exp Biol 2007;210:1526-1547

Secuencias reguladoras de la transcripción

Expresión diferencial de tejidos

Los genes se expresan de forma diferencial:

Durante el desarrollo embrionario

En las células de distintos tejidos

En momentos de estrés

En situaciones patológicas

Fases reproductoras

Para adaptarse al medio

Proyectos que estudian la expresión diferencial

Expresión diferencial entre diferentes condiciones

Proyecto ENCODE

Procesos en las células están relacionados

La biología de sistemas es el modelado computacional y matemática de los sistemas biológicos complejos

Proyectos internacionales

Geuvadis Project

Image extracted from :
Hum Mol Genet. 2010 Oct 15;19(R2):R188-96

[TwinsUK](http://twinsuk.co.uk)

ALSPAC. Seguimiento de 14000 niños nacidos entre 1991-1992

Eventos que están permitiendo la evolución de la biomedicina

**Decreasing Cost of NGS
Data Generation**

Source: NHGRI

**Increasing analytical
tool development**

Source: Bioconductor Ann Report FY14

**Growing amount of public
data and data users**

Source: NLM Cong. Report FY15

Búsqueda de marcadores que definan grupos con características patológicas comunes

Medicina Personalizada

Adaptación de la medicación

La evolución de los conocimientos en biomedicina y la aplicación de sus resultados requiere múltiples disciplinas donde la bioinformática tiene un papel fundamental